

דף מעקב להורה | השפעת הטיפול התרופתי להפרעת קשב



מטרת דף מעקב זה היא לסייע להורה ולילד לעקוב אחר השינויים בסימפטומים ובאיכות החיים בהשפעת טיפול תרופתי להפרעת קשב. האיגודים המקצועיים ממליצים על ביצוע מעקב סדיר לילדים הנוטלים טיפול תרופתי להפרעת קשב, בהתאם להמלצת הרופא המטפל.

הידעת? הפרעת קשב משפיעה על מגוון תחומי החיים



הפרעת קשב מאופיינת בשלושה תסמיני ליבה: הפרעה בקשב, בהיפראקטיביות ובאימפולסביות. ממחקרים עולה שישנו קשר בין הפרעת קשב למגוון תחומי חיים:



תחום לימודי



תחום חברתית ומשפחתי
(חברים, הורים ואחים)



תחום התנהגותי
(בבית ובבית הספר)



נטיה ללקיחת סיכונים ותאונות דרכים



דימוי עצמי

לאחר התחלת הטיפול התרופתי והגעה למינון יציב, באיזה תחום חל שיפור או החמרה בהשפעת הטיפול התרופתי:

הפרעת קשב משתנה לאורך החיים, וייתכן כי צרכי הילד ישתנו בהתאם. לדוגמה, ככל שהילד מתבגר הפעילויות בשעות אחר הצהריים והפנאי הופכות למשמעותיות יותר (תנועות נוער, חוגים, נהיגה ועוד).

החמרה	ללא שיפור	שיפור מועט	שיפור משמעותי	
				תחום התנהגותי לדוגמה, פחות מתעמת ומתנהג בצורה לא הולמת עם אנשים בסביבתו
				תחום חברתי לדוגמה, משתתף במשחקים עם חברים, מוזמן לחברים
				תחום משפחתי לדוגמה, אווירה רגועה יותר בבית, פחות ויכוחים עם ההורים/אחים
				תחום לימודי לדוגמה, מרוכז יותר זמן במהלך השיעור, מפטפט פחות בשיעור
				שגרת אחר הצהריים והערב התארגנות ניוחה לשינה, משתתף ומשתלב היטב בחוגים

ממחקרים עולה כי טיפול תרופתי להפרעת קשב עשוי לגרום לתופעות לוואי. שכיחות תופעות לוואי מסוימות עשויה לרדת לאחר מספר שבועות. אם הופיעה תופעת לוואי או אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, פנה לרופא המטפל.

שימו  מטרת הטיפול התרופתי היא שיפור במגוון תחומי החיים, במידה והשינוי אינו מספק - פנה לרופא המטפל.

References:

1. Harpin VA. The effect of ADHD on the life of an individual, their family, and community from preschool to adult life. Arch Dis Child 2005; 90(Suppl 1): i2–i7. | 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth edition (DSM-5). American Psychiatric Publishing, 2013: 59–66. | 3. Canadian ADHD Resource Alliance (CADDRA): Canadian ADHD Practice Guidelines, Fourth Edition, Toronto ON; CADDRA, 2018 | 4. Long-Term Safety and Efficacy of LDX in Children and Adolescents with ADHD: A phase IV, 2-year, open-label Study in Europe

למידע נוסף אודות ההפרעה והטיפול יש לפנות אל הרופא המטפל